

مسیر شاخص های مراقبت سالمندان - غیر پزشکی :

پوشش غربالگری تغذیه ، غربالگری افسردگی و مراقبت از نظر فشار خون و سقوط و عدم تعادل انجام شده توسط غیر پزشکی :

تعداد سالمندانی که خدمت مورد نظر را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان (جهت محاسبه این شاخص بایستی تعداد افرادی که ارزیابی تغذیه، فشار خون، افسردگی ، سقوط و عدم تعادل برای آنها انجام شده را از فعالیت کاربران استخراج نموده و بر جمعیت سالمندان ابتدای سال تقسیم کنید.)

پوشش خطر سنجی انجام شده در سالمندان ۶۰-۷۰ سال توسط غیر پزشکی :

تعداد سالمندان ۶۰-۷۰ سال که خدمت پیشگیری از سکنه های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت ، فشار خون بالا و اختلالات چربیهای خون مورد را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال (جهت محاسبه این شاخص بایستی از زبانه خدمات ، گزارش مراقبتها ، گزارش تشخیص ها، آیتم پیشگیری از سکنه های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت ، فشار خون بالا و اختلالات چربیهای خون را انتخاب و بعد از مشخص نمودن بازه زمانی و سن ۶۰-۷۰ سال جستجو نموده، سپس مجموع آیتم های سطح خطر کمتر از ۱۰٪ و سطح خطر بین ۲۰-۱۰٪ و سطح خطر ۳۰٪ به بالاست و سطح خطر ۳۰٪ به بالا مبتنی بر بیماریهای قلبی عروقی را بدست آورده و در صورت قرار دهید. سپس در مخرج جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال ابتدای سال را قرار داده و در ۱۰۰ ضرب کنید.)

پوشش تشخیص زود هنگام سرطان پستان در سالمندان ۶۰-۷۰ سال توسط غیر پزشکی :

تعداد سالمندان زن ۶۰-۷۰ سال که خدمت تشخیص زود هنگام سرطان پستان- ماما را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان زن ۶۰-۷۰ سال (جهت محاسبه این شاخص بایستی از زبانه خدمات ، گزارش مراقبتها ، گزارش تشخیص ها، آیتم تشخیص زود هنگام سرطان پستان- ماما را انتخاب نموده و بعد از تعیین بازه زمانی موردنظر و سن جستجو زده و مجموع آیتمهای مشکوک و نیاز مند ارجاع و نیازمند پیگیری و طبیعی را محاسبه نموده و در صورت قرار دهید. سپس در مخرج جمعیت سالمندان زن ۶۰-۷۰ سال ابتدای سال را قرار داده و در ۱۰۰ ضرب کنید.)

پوشش غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ در سالمندان ۶۰-۷۰ سال توسط غیر پزشکی :

تعداد سالمندان ۶۰-۷۰ سال که خدمت غربالگری و تشخیص زود هنگام روده بزرگ غیر پزشکی را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال (جهت محاسبه این شاخص بایستی از زبانه خدمات ، گزارش مراقبتها ، گزارش علایم و نشانه ها، آیتم غربالگری و تشخیص زود هنگام روده بزرگ غیر پزشکی را انتخاب نموده و بعد از تعیین بازه زمانی موردنظر و سن جستجو زده و مجموع پاسخ مثبت و منفی در کد ۱۷۸۷۸ را محاسبه نموده و در صورت قرار دهید. سپس در مخرج جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال ابتدای سال را قرار داده و در ۱۰۰ ضرب کنید.)

پوشش مراقبت سالمندان توسط غیر پزشکی :

تعداد سالمندانی که خدمات سالمندی را به صورت کامل توسط غیر پزشکی دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان (جهت محاسبه این شاخص بایستی سالمندی که تمام ارزیابی ها یعنی ارزیابی تغذیه، فشار خون، افسردگی ، سقوط و عدم تعادل را دریافت کرده است استخراج نموده بر جمعیت سالمندان ابتدای سال تقسیم کنید.) از آنجاییکه این شاخص در حال حاضر از سامانه سیب قابل استخراج نمی باشد کمترین شاخص استان که پوشش مراقبت افسردگی است به عنوان شاخص پوشش مراقبت سالمندان در نظر گرفته می شود.

مسیر شاخص های مراقبت سالمندان – پزشک :

پوشش غربالگری تغذیه ، غربالگری افسردگی و مراقبت از نظر سقوط و عدم تعادل انجام شده توسط پزشک :

تعداد سالمندانی که خدمت مورد نظر را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان (جهت محاسبه این شاخص بایستی تعداد افرادی که ارزیابی تغذیه، افسردگی ، سقوط و عدم تعادل برای آنها انجام شده را از فعالیت کاربران استخراج نموده و بر جمعیت سالمندان ابتدای سال تقسیم کنید.)

پوشش غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ ویزیت اول در سالمندان ۶۰-۷۰ سال توسط پزشک :

تعداد سالمندان ۶۰-۷۰ سال که خدمت غربالگری و تشخیص زود هنگام روده بزرگ ویزیت اول پزشک را دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال (جهت محاسبه این شاخص بایستی از زبانه خدمات ، گزارش مراقبتها ، گزارش علایم و نشانه ها، آیتم غربالگری و تشخیص زود هنگام روده بزرگ ویزیت اول پزشک را انتخاب نموده و بعد از تعیین بازه زمانی و سن مورد نظر جستجو زده و مجموع پاسخ مثبت و منفی در کد ۱۷۸۷۸ را محاسبه نموده و در صورت قرار دهید. سپس در مخرج جمعیت سالمندان ۶۰-۷۰ سال ابتدای سال را قرار داده و در ۱۰۰ ضرب کنید.)

پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک :

تعداد سالمندانی که خدمات سالمندی توسط پزشک را به صورت کامل دریافت کرده اند تقسیم بر جمعیت سالمندان (جهت محاسبه این شاخص بایستی سالمندی که تمام ارزیابی ها شامل ارزیابی تغذیه، افسردگی ، سقوط و عدم تعادل را از پزشک دریافت نموده استخراج بر جمعیت سالمندان ابتدای سال تقسیم کنید.) از آنجاییکه این شاخص در حال حاضر از سامانه سیب قابل استخراج نمی باشد ، پوشش مراقبت افسردگی است به عنوان شاخص پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک در نظر گرفته می شود.

شاخص شیوه زندگی سالم در دروه سالمندی:

تعداد سالمندانی ۶۰-۷۰ سال که در کلاس های شیوه زندگی سالم در دروان سالمندی شرکت نموده اند (یک کلاس یا چند کلاس) تقسیم بر جمعیت کل سالمندان ۶۰-۷۰ سال